

### Серия 3, с упражнениями.

1. В республике математиков выбрали число  $\alpha > 2$  и выпустили монеты достоинством в 1 гривну, а также  $\alpha^k$  гривен при каждом натуральном  $k$ . При этом  $\alpha$  было выбрано так, что достоинства всех монет, кроме самой мелкой, иррациональны. Могло ли оказаться, что каждую сумму в натуральное число гривен можно набрать этими монетами, используя монеты каждого достоинства не более 6 раз?

2. Найдите наибольшее вещественное  $k$ , для которого существуют множество  $X$  и его подмножества  $Y_1, Y_2, \dots, Y_{31}$ , удовлетворяющие следующим двум условиям:

(1) для любых двух элементов  $X$  найдется подмножество  $Y_i$ , не содержащее ни одного из них;

(2) при любом сопоставлении подмножествам  $Y_i$  неотрицательных чисел  $\alpha_i$  с суммой, равной 1, найдется такой элемент из  $X$ , что сумма  $\alpha_i$ , сопоставленных всем содержащим его подмножествам  $Y_i$ , не меньше  $k$ .

3. В клетках таблицы  $n \times n$  расставлены неотрицательные числа так, что в каждой строке и в каждом столбце сумма всех чисел равна 1. Разрешается вычесть одно и то же положительное число из любых  $n$  клеток, никакие две из которых не стоят в одной строке или в одном столбце. Докажите, что такими операциями можно получить таблицу из одних нулей. (Число и набор клеток заново выбираются для каждой операции.)

4. Пусть  $r \geq 1, k \geq 1$  – целые числа. Для каждого множества  $A$  обозначим  $\binom{A}{r}$  множество подмножеств  $A$  из  $r$  элементов. Докажите, что для каждого бесконечного множества  $A$  и каждой функции  $f : \binom{A}{r} \rightarrow \{1, 2, \dots, k\}$  существует бесконечное подмножество  $B \subset A$  такое, что  $f(x) = f(y)$  для любых  $x, y \in \binom{B}{r}$ .

5. На прямой выбрано 100 множеств  $A_1, A_2, \dots, A_{100}$ , каждое из которых является объединением 100 попарно непересекающихся отрезков. Докажите, что пересечение множеств  $A_1, A_2, \dots, A_{100}$  является объединением не более 9901 попарно непересекающихся отрезков (точка также считается отрезком).

6. На прямоугольном столе лежат равные картонные квадраты  $n$  различных цветов со сторонами, параллельными сторонам стола. Если рассмотреть любые  $n$  квадратов различных цветов, то какие-нибудь два из них можно прибить к столу одним гвоздем. Докажите, что все квадраты некоторого цвета можно прибить к столу  $2n - 2$  гвоздями.

7. В стране несколько городов, некоторые пары городов соединены двусторонними беспосадочными авиалиниями, принадлежащими  $k$  авиакомпаниям. Известно, что любые две линии одной авиакомпании имеют общий конец. Докажите, что все города можно разбить на  $k + 2$  группы так, что никакие два города из одной группы не соединены авиалинией.

8. По кругу расставлены числа  $1, 2, \dots, n$ . Если соседнее с числом  $a$  по часовой стрелке – число  $b > a + 1$ , то числа  $a$  и  $b$  можно поменять местами. Докажите, что больше  $\frac{n(n-1)(n-2)}{6}$  таких операций сделать не удастся.